

## **THÔNG BÁO**

### **V/v hướng dẫn phòng trừ dịch hại trên lúa vụ Xuân**

Hiện nay, cây lúa vụ Xuân đang ở giai đoạn 3 - 4 lá. Để chủ động chăm sóc, phát hiện và phòng trừ kịp thời các đối tượng dịch hại trên lúa vụ Xuân 2025, UBND phường Văn Yên thông báo một số nội dung như sau:

**1. Đề nghị các hộ sản xuất thường xuyên thăm đồng, thực hiện tốt công tác điều tra phát hiện các đối tượng dịch hại; bón phân cân đối hợp lý ngay từ đầu vụ, tăng cường bón phân hữu cơ; tranh thủ thời tiết thuận lợi tập trung chăm sóc tạo điều kiện cho lúa sinh trưởng tốt, tăng khả năng chống chịu.**

#### **2. Phòng trừ cỏ dại**

- Sử dụng một trong các loại thuốc sau: Sharon 100WP, Beron 10WP, Aloha 25WP, TopSuper 460WP: pha 10 -14 g thuốc vào 20 lít nước, phun cho 1 sào 500m<sup>2</sup>.

Tuân thủ nguyên tắc “4 đúng”, trong quá trình xử lý thuốc, không phun thuốc khi nền nhiệt độ < 15<sup>0</sup>C, lúc sáng sớm còn sương, có gió lớn.

#### **3. Phòng trừ bọ trĩ:** Sử dụng một trong các loại thuốc sau

- Regent 800WP: Pha 1,6 g vào 20 lít nước, phun cho 1 sào.
- Dantox 5EC: Pha 25ml thuốc vào 20 lít nước, phun cho 1 sào.
- Angun 5WG: Pha 10g vào bình 20 lít, phun cho 1 sào.

**4. Phòng trừ ruồi đục nõn, tuyến trùng rễ:** Sử dụng một trong các loại thuốc sau.

- + Regent 800WP: Pha 1,6 g vào bình 20 lít nước, phun cho 1 sào.
- + Proclaim 1.9EC: Pha 20 ml thuốc vào 20 lít nước, phun cho 1 sào.
- + Padan 95SP: Pha 30 g vào 20 lít nước, phun cho 1 sào.

#### **5. Phòng trừ ốc bươu vàng**

Tình trạng ốc bươu vàng gây hại trên đồng ruộng làm ảnh hưởng đến tỷ lệ, mật độ cây lúa rất lớn, đề nghị bà con cần chủ động phòng trừ bằng các biện pháp sau:

- Biện pháp thủ công: Bắt ốc bằng tay và thu gom ổ trứng để tiêu hủy; sử dụng dây lá khoai lang, lá đu đủ, xơ mít bó thành từng bó thả xuống nước dọc theo bờ để dẫn dụ ốc đến rồi thu bắt; làm rãnh sâu 20 cm xung quanh và trong ruộng, rút dần nước nhằm tập trung ốc vào rãnh để bắt gom. Dùng lưới chắn trước các lỗ nước dẫn vào ruộng để ngăn không cho ốc vào.

- Biện pháp hóa học: Nếu mật độ ốc cao, sử dụng các loại thuốc hóa học sau:

+ Anhead 12GR: Trộn thuốc với cát rải lên ruộng, dùng 0,25-0,4 kg thuốc/sào.

+ Notralis 18gr: Rải đều 250 gam thuốc cho 1 sào.

+ Dioto 250EC: Pha 100ml thuốc vào 20 lít nước phun cho 1 sào.

+ VT-Dax 700WP: Pha 20g thuốc vào 20 lít nước phun cho 1 sào.

**Lưu ý:** Trên cây lúa rệp xanh là đối tượng thứ yếu chỉ xuất hiện giai đoạn đầu vụ và ít ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển của lúa nên đề nghị bà con nông dân không sử dụng thuốc hóa học để phun phòng trừ rệp.

**6.** Giao đồng chí Cán bộ phụ trách nông nghiệp căn cứ vào tình hình thực tế điều hành nguồn nước tự chảy, trạm bơm điện đảm bảo phục vụ công tác chăm bón; phối hợp với cán bộ Trung tâm Ứng dụng KHKT và bảo vệ cây trồng vật nuôi thành phố thường xuyên thăm đồng, phát hiện sâu bệnh, tham mưu cho UBND phường bổ cứu kịp thời.

**7.** Đề nghị UBMTTQ và các tổ chức đoàn thể tăng cường công tác vận động đoàn viên, hội viên và người nông dân chủ động, thực hiện tốt các biện pháp chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh.

Nhận được Thông báo này, đề nghị các đồng chí Tổ trưởng tổ dân phố thông báo rộng rãi đến các hộ sản xuất thực hiện tốt các nội dung đã thông báo trên./.

**Nơi nhận:**

- Đảng ủy - HĐND phường;
- Chủ tịch, PCT UBND phường;
- UBMTTQ và các Đoàn thể;
- BTCB, Tổ trưởng TDP;
- Lưu VT, NN.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Lê Tuấn Anh**